

Gliapherese für die Liquid Biopsy und zur Gewinnung targetspezifischer Moleküle


Dr. Ulrich Kübler, Dr. Jörn Schnepel

Brain Tumor 2019, Berlin

Das Glioblastom entsteht durch den Verlust der Regelbarkeit normaler Gliazellen und die Entstehung von Tumor-Stammzellen in einer molekularen Nische. Die Labor-Praxisklinik Dr. Kübler & Partner GbR verfügt über ein System zur Isolierung, Quantifizierung und molekularen Charakterisierung dieser Zellen (EP1486787B1). Nach Auflösung differenzierter Zellschichten finden sich in der Blutbahn GFAP-exprimierende Tumor-Stammzellen, welche die Epithelial-mesenchymale Transition (EMT) durchlaufen haben und welche die Heterogenität sowohl des Primärtumors als auch der disseminierten Zellen widerspiegeln. Die Zellen verändern ihre spezifischen Eigenschaften und erlangen dadurch Migrationsfähigkeit und Invasivität. Sie befinden sich schon in der Blutbahn lange bevor der Primärtumor oder Metastasen bildgebend sichtbar werden. Das frühzeitige Erkennen dieser Zellen bedeutet eine Revolution in Vorsorge, Diagnostik und Therapie.^[1-9,14]


Gliapherese

Die Diagnostische Apherese (Gliapherese) ermöglicht die biopsiefreie und quantitative Gewinnung von GFAP exprimierenden Zellen sowie von Vorläuferzellen des Immunsystems aus der Blutbahn. Zusätzlich werden molekular-pathologische Biomarker wie PD-L1, c-Met, Oct-3/4, EGFR, erb/B2, erb/B3, myc, ras, p53m, MDR, CD44v5/v6, VEGF, Akt/mTOR, IDO, Survivin und Urokinase detektiert, welche Hinweise auf Metastasen-initiierende Tumor-Stammzellen (metastasis initiating Cancer Stem Cells (MICs)) geben können.^[10-14]



Detection


Ein speziell entwickelter ELISA-Test (enzyme linked immunosorbent assay) sowie die Anwendung der FISH-Analytik (fluorescence in situ hybridisation) erlaubt den Einzelzell-Nachweis und somit eine Quantifizierung. Durch die Bestimmung molekulärer Biomarker wird ein Expressionsprofil der apheretisch gewonnenen zirkulierenden Tumor-Stammzelle erstellt. Die Vorläuferzellen des Immunsystems werden kultiviert und auf ihre Aufgabe vorbereitet.^[7,14]




GFAP positive Zellen



Oct-3/4 positive Zellen





MET Genamplifikation



c-erb/B2 Genamplifikation

Konsequenz

Diese Liquid Biopsy auf zellulärer Basis erlaubt die Isolierung, Quantifizierung und molekulare Charakterisierung zirkulierender Tumor-Stammzellen. Die isolierten Zellen dienen zum einen der Verlaufskontrolle, zum anderen als Quelle immunogener Moleküle für die targetspezifische Immuntherapie.^[15]



Literatur

- ^[1]Glioblastoma: therapeutic challenges, what lies ahead, Lima, F.R. et al., 2012, *Biochim. Biophys. Acta*, 1826(2), 338-349.
- ^[2]Glioblastoma multiforme: overview of current treatment and future perspectives, Anton, K. et al., 2012, *Haematol. Oncol. Clin. North Am.*, 26(4), 825-853.
- ^[3]New molecularly targeted therapies for glioblastoma multiforme, Polivka, J. et al., 2012, *Cancer Res.*, 32(7), 2935-2946.
- ^[4]EMT, cancer stem cells and drug resistance, emerging axis of evil, Shing, A., Settleman, J., *Oncogene* 2010, 29, 4741-4751.
- ^[5]p53 regulates epithelial mesenchymal transition and stem cell properties through modulating mi-RNAs, Chang, C., et al., *Nature Cell Biology* 2011, 13, 317-323.
- ^[6]Cancer Stem Cells, Jordan, CT., Guzman, ML., Noble, M., N. *Engl. J. Med.* 2006 355;12, 1253-61.
- ^[7]c-MET expression level in primary colon cancer:a predictor of tumor invasion and lymph node metastases, Takeuchi, H. et al., *Clin Cancer Res* 2003, Vol.9, 1480-1488.
- ^[8]Tumor cells circulate in the blood of all major carcinomas, but not in healthy subjects or patients with nonmalignant diseases, Allard, W.J., et al, *Clin Can Res*. 2004, 10, 6897-6904.
- ^[9]The evidence for Cancer Stem Cells, Niederhuber, J., (NCI, Bethesda) 5th Int. H.F.C. Behr-Symposium 2008, DKFZ Heidelberg.
- ^[10]Intratumor Heterogeneity and Branched Evolution Revealed by Multiregion Sequencing, Gerlinger, M. et al., 2012, *N. Engl. J. Med.*, 366(10), 883-892.
- ^[11]Epithelial-mesenchymal transitions in development and disease, Thiery, JP., et al. 2009, *Cell* 139, 871-890.
- ^[12]The epithelial-mesenchymal transition generates cells with properties of stem cells, Mani, SA., 2008, *Cell* 133, 704-715.
- ^[13]Transitions between epithelial and mesenchymal states: acquisition of malignant and stem cell traits, Polyak, K., Weinberg, RA., 2009, *Nat Rev Cancer* 9, 265-273.
- ^[14]Process for the *in vitro* diagnosis of a glioma or an astrocytoma and a pharmaceutical mixture for treatment, Kübler, U., 2011, Eur. Patent EP1486787B1.
- ^[15]Isolation and Characterization of Circulating Cancer Cells as Vaccine Candidates, Dr. Kübler GmbH, Cancer Vaccines 1996, New York.